


Bild 1



Bild 2




Bild 3



Börja med att gå in på Regionens startsida

Bild 4



Skrolla ner på sidan, så hittar ni webbplats för vårdgivare

Bild 5




Bild 6






Bild 7




Gå in på Barnhälsovård

Bild 8



Och välj styrande dokument


Bild 9



Välj "rutin Samverkan Tandvård och Barnhälsovård (BHV)"

Här finns den uppdaterade rutinen 'Samverkan Tandvård och Barnhälsovård (BHV)

Bild 10



Syfte
Barnhälsovård och Tandvård
hjälpas åt att stötta barn som har
hög risk att utveckla dålig
tandhälsa eller allmänhälsa

Bild 11




Bild 12





Bild 13

Karies hos förskolebarn – Early Childhood Caries

- Barn under 6 år
- Snabbare förlopp
- Skiljer sig från karies hos vuxna genom placering på tandytan



Tharoff et al 2019

Bild 14

Karies kan påverka barnets livskvalitet negativt

Upprepad smärta



Svårt att sova




Frånvaro från förskola



Svårigheter att äta

Goodwin et al 2016
Raholew et al 2017

Bild 15



Karies är världens vanligaste kroniska sjukdom
560 miljoner barn har karies

År 2021 hade 22% av de svenska 6-åringarna karies = 1 av 5 barn har karies

WHO 2017
Statistikmyndigheten 2022

Bild 16

Enligt rutinen skall remiss från BHV skickas till Tandvården vid:

- Selektivt ätande
- O gynnsamma vanor mat och dryck
- Nattmål eller frekvent flaskmatning/ämning efter 1,5 års ålder
- Bristande tandborstning eller använder inte fluorid tandkräm
- Syskon med karies
- Svårt med gränssättning
- Flera återbud/uteblivande
- Infektionsbenägenhet / sjukdom / medicinering

Bild 17

Remiss till Tandvården

- Selektivt ätande

Neuropsykiatriska funktionshinder - NPF



- Uppmuntra borstning
- Borsta alltid 2 ggr/dag – rutiner viktigt
- Smakfri tandkräm
- Selektivt ätande, försök att uppmuntra goda kostvanor. Vatten vid törst. Vatten eller mjölk till måltiderna. Undvik söta drycker.

Bild 18

Remiss till Tandvården

- O gynnsamma vanor mat och dryck
- Nattmål eller frekvent flaskmatning/ämning efter 1,5 års ålder



Det är viktigt med regelbundna måltider - småätande mellan målen – ökad risk

Nattmål – undvik

Klibbig och söta kost (chips, keks, majståbgar, russin mm) - undvik

Söta drycker (juice, saft O'Boy) – undvik.

Drick ur mugg från 1 års ålder!

Vatten vid törst!

Bild 19

Många nyblivna föräldrar blir uppmärksamma på sina egna matvanor när de får barn och är öppna för att ändra dem

Munhygien- och kostvanor som grundläggs under spädbarnsåret upprätthålls under småbarnsåren.



© Sveriges Läkemedelsföretagsförening

Bild 20

Remiss till Tandvården



- Bristande tandborstning eller använder inte fluorid tandkräm

Tandborstning 2 gånger/dag - FLUOR

- Börja borsta från första tanden
- Borsta morgon och kväll
- Använd FLUORID-tandkräm i samma storlek som barnets lillfinger nagel
- Skölj inte munnen efter borstning

Bild 21

Borsta tänderna på morgon efter frukost och i på kvällen efter maten



VUXEN ska borsta
Barn som inte får hjälp med tandborstning vid 2 års ålder har ökad risk för karies vid 5 år.

Tillväxtprojektet i Halland:
Vid 2 års ålder fick 77% av barnen sina tänder borstade 2 gånger/dag.

Bild 22



Bild 23

Remiss till Tandvården

- Svårt med gränssättning
- Flera återbud/uteblivande

Bild 24

Remiss till Tandvården

- Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering
 - Astma
 - Epilepsi
 - Diabetes, svårinställd
 - Hjärtfel, CP, kromosomavvikelse mm.
 - Mediciner – muntorrhet
- Muskelsvaghet – nedsatt oralmotorik:
 - orka gäpa
 - orka äta
 - orka tugga
 - annan bettutveckling pga annat tryck från kind och tunga, tuggmönster
 - nappflaska längre tid, andra hjälpmedel

Bild 25

Remiss till Tandvården

- Syskon med karies

Socioekonomiska faktorer tex:
Invandrarbakgrund
Utbildningsnivå



Ståhlman-Blom et al. 2008, Törner et al. 2011, Peltola et al. 2010, Witter et al. 2009, Christoffersen 1995, Pinescu och Söderby

Bild 26

Familjehemsplacering

Tar tid innan barnen kallas till tandvård

Bild 27

Allmäntandvård

- 1 år - tandsköterska – information och riskbedömning
- Därefter individuell kallelse beroende på risk, ibland 24 månaders intervall
 - mycket kan hända på 2 år!
 - kontakta barnets tandläkare om ni ser karies vid besök på BHV, tack! ©

NI ÄR VIKTIGA!



Bild 28





Bild 29



Ligger på Vårdgivarwebben och finns i en mängd olika språk.

Bild 30

